

BOLETIM CLIMÁTICO Nº 79



OUTUBRO DE 2019

1. DESCRIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

Localidade: IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho

- Estação Meteorológica: “Davis Vantage Pro 2”
- Latitude: $21^{\circ} 20' 47''\text{S}$ e Longitude: $46^{\circ} 32' 04''\text{W}$
- Altitude Média: 1033 metros




Figura 1: Localização do município de Muzambinho na região da Alta Mogiana e no Estado de Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Elaboração Própria.

Clima predominante na região:

- Segundo KÖPPEN (1918): Temperado úmido com inverno seco e verão moderadamente quente - **Cwb**;
- Segundo THORNTHWAITE (1948): Clima úmido com pequena deficiência hídrica – Mesotérmico - **B₄rB'₂a**;

2. ANÁLISES DOS DADOS CLIMÁTICOS

Neste boletim são apresentados e analisados dados climáticos mensais das médias históricas de 1974-1985 e 2006-2013 comparados com os valores aferidos nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Em outubro/2019 observou-se temperaturas do ar mais elevadas, chegando a uma média mensal de 22,2°C. Essa temperatura está dentro da normalidade, pois nas médias históricas de 1974-1985 e 2006-2013 foram observados valores de 21,05°C e 22,4 °C, respectivamente (*Figura 2.A*).




Figura 2: Temperaturas médias do ar (°C) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2013 e 2019 (A) e dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

Na região do Sul de Minas o índice pluviométrico em outubro/2019 foi de apenas 42,6 mm mês⁻¹, valor este abaixo do esperado. Nas médias históricas, no mesmo período, se observou 105,5 mm mês⁻¹ no período de 1974-1985 e 136 mm mês⁻¹ em 2006-2013 (*Figura 3*).




Figura 3: Precipitação pluviométrica média mensal (mm) do período de 1974-1985, 2006-2013 e 2014 (A) e dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho, MG.

Com o índice pluviométrico de outubro/2019 a chuva acumulada foi de 1074 mm, chegando próximos dos valores aferidos nas médias históricas do período de 1974-1985 e 2006-2013 (Figura 4.A). Dos anos anteriores, 2014 foi nitidamente o mais seco e 2016 o ano mais úmido.




Figura 4: Precipitação pluviométrica acumulada (mm anual⁻¹) do período de 1974-1985, 2006-2013 e 2014-2018 (A) e dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho, MG.

A evapotranspiração potencial, a capacidade de água disponível (CAD) e o armazenamento de água no solo (ARM), além do extrato do balanço hídrico foram realizados pelo Software *SYSTEM FOR WATER BALANCE “SYSWAB”*. A evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de THORNTHWAITE (1948) e o balanço hídrico pelo método de THORNTHWAITE E MATHER (1955).

Em outubro/2019 foi aferida uma evapotranspiração de 91 mm mês^{-1} , valor este dentro da normalidade para a época do ano, pois as médias históricas (1974-1985 e 2006-2013) foram de 90 e 88,8 mm no mês, respectivamente (*Figura 5*).




Figura 5: Evapotranspiração potencial mensal (mm mês^{-1}) do período de 1974-1985, 2006-2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (A) e dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho, MG.

O armazenamento de água no solo (ARM) diz respeito à quantidade de água disponível no sistema solo-planta-atmosfera para os cultivos agrícolas. Em outubro/2019 no Sul de Minas Gerais houve o menor ARM de todo ao ano, chegando a 14.7% da sua capacidade total de armazenamento (*Figura 6*).




Figura 6: Armazenamento de água no perfil do solo (mm mês^{-1}) do período de 1974-1985, 2006-2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho, MG.

O balanço hídrico climatológico (BHC) é útil para definir os cultivos que melhor se adaptam as diferentes regiões, além das melhores épocas de semeaduras para se efetuar os plantios. Enfim, todo planejamento do agricultor pode e deve ser baseado no BHC. Em outubro é normal que os BHC se apresentem com excedentes hídricos, em decorrência das precipitações que geralmente ocorrem nesta época, essa questão pode ser observada nas médias históricas de 1974-1985 e 2006-2013 (*Figura 8.A.B*). Em outubro/2019 foi diferente, pois o BHC demonstrou-se um elevado déficit hídrico de -39 mm, que já vem se estendendo desde o mês de maio.




Figura 8: Balanço hídrico mensal sequencial (THORNTHTWAITE E MATHER, 1955) no período de 1974-1985 (A), 2006-2013 (B), para os anos de 2014 (C), 2015 (D), 2016 (E), 2017 (F), 2018 e 2019 para a região do Sul de Minas, Muzambinho.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- ⇒ Outubro/2019 demonstrou ser um mês de elevadas temperaturas do ar com baixo índice pluviométrico.
- ⇒ A precipitação pluviométrica de outubro/2019 não supriu todas as necessidades dos cultivos, o que acarretou no menor armazenamento de água no solo do ano e em elevados déficit hídricos.

Muzambinho, 25 de novembro de 2019.

EQUIPE RESPONSÁVEL:

Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido

Engº Agrº Dr. Professor do IFMS – Campus Naviraí

Paulo Sérgio de Souza

Engº Agrº Dr. Professor do IFSULDEMINAS– Campus Muzambinho



Grupo de Pesquisa em Fruticultura e Agrometeorologia

